

QUESTÕES 01 A 10 – Políticas Públicas em Saúde, SUS.

01. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado com base na Constituição Federal de 1988 e é orientado por princípios que definem sua organização e funcionamento. Neste contexto, selecione a assertiva a seguir, que apresenta corretamente um desses princípios fundamentais e seu papel no funcionamento do SUS.

- a) O princípio da integralidade prevê que o SUS deve oferecer cuidados apenas em nível de atenção primária, limitando o acesso a serviços especializados e hospitalares.
- b) O princípio da universalidade assegura que todo cidadão tem direito ao acesso igualitário e gratuito aos serviços de saúde, independentemente de sua condição social ou econômica.
- c) O princípio da equidade busca promover igualdade de acesso aos serviços de saúde, tratando todos os indivíduos da mesma maneira, independentemente de suas necessidades.
- d) O princípio da descentralização estabelece que a gestão do SUS deve ser centralizada no governo federal, com as decisões sendo tomadas principalmente em Brasília.

1

02. O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma das maiores conquistas sociais no Brasil, garantindo acesso universal, integral e gratuito à saúde para toda a população. Seus fundamentos estão embasados em princípios que orientam sua organização e funcionamento. Diante dos princípios éticos e doutrinários do SUS, um deles assegura o direito de todos os cidadãos à assistência integral, incluindo promoção, proteção e recuperação da saúde. Neste contexto, selecione a assertiva que melhor descreve o princípio que garante a abrangência e a amplitude dos serviços de saúde oferecidos pelo SUS.

- a) Universalidade.
- b) Equidade.
- c) Integralidade.
- d) Descentralização.

03. A Lei 8080/1990 é uma legislação fundamental que estabelece as diretrizes para a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. O artigo 2º dessa lei descreve os fundamentos que orientam as políticas de saúde no país, fornecendo um arcabouço legal para a prestação de serviços de saúde. Neste contexto, o artigo 2º da Lei 8080/1990 estabelece os princípios que norteiam o SUS. De acordo com esse artigo, institui-se condições indispensáveis em relação a saúde dos Brasileiros. Dentre as assertivas abaixo, assinale aquela que se tornou dever do Estado.

- a) A saúde deve ser complementada pelo estado e associada a verbas privadas das empresas aos seus colaboradores.
- b) A saúde deve ser custeada pelo setor privado a partir do momento que estabelece vínculo de trabalho com seu colaborador.
- c) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- d) A saúde deve ser totalmente descentralizada da responsabilidade do estado e passa a ser dever da população arcar com todo seu custeio.

04. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) busca promover a formação contínua dos trabalhadores da saúde, integrando a educação ao trabalho. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, o princípio fundamental para a implementação da PNEPS é:

- a) Foco exclusivo na formação teórica dos profissionais de saúde.
- b) Prioridade em cursos, sem necessidade de articulação com as práticas de saúde.
- c) Exclusão de setores sociais na construção dos processos educativos.
- d) Integração entre ensino, serviço e comunidade.

05. A Organização Mundial de Saúde (OMS) assim define os Determinantes Sociais da Saúde (DSS): “As circunstâncias nas quais as pessoas nascem, crescem, trabalham, vivem, e envelhecem, e o amplo conjunto de forças e sistemas que moldam as condições da vida cotidiana. Essas forças e sistemas incluem sistemas e políticas econômicas, agendas de desenvolvimento, normas sociais, políticas sociais e sistemas políticos”. Sendo assim, entendemos que os DSS, são fatores que influenciam diretamente as condições de vida e saúde da população. Pode-se afirmar que melhor representa um exemplo de determinante social da saúde e sua influência no bem-estar das pessoas:

- a) Condições de trabalho e emprego são determinantes sociais da saúde, pois afetam a qualidade de vida, mas o desemprego não está relacionado ao aumento de doenças crônicas.
- b) O meio ambiente físico, como a poluição do ar, é um determinante social da saúde, mas ele tem pouco impacto em doenças respiratórias e cardiovasculares.
- c) Habitação não é considerada um determinante social da saúde, pois as condições de moradia não afetam diretamente o estado de saúde de uma população.
- d) **A educação é um dos principais determinantes sociais da saúde, pois pessoas com maior nível educacional tendem a adotar hábitos de vida mais saudáveis e ter melhores condições de saúde.**

2

06. A violência está inserida no cotidiano das pequenas e grandes cidades, sendo uma realidade presente nas relações sociais das mais variadas formas. A ocorrência das violências envolve questões socioeconômicas, demográficas, além do crescimento das cidades, demandas de natureza política, religiosa e cultural. A violência interpessoal e autoprovocada passou a integrar o Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN a partir da Portaria nº 104 MS/GM, de 25 de janeiro de 2011, estando inserida no programa do Ministério da Saúde (VIVA/SINAN/MS) e no VIVA/Inquérito. De acordo com o documento "Notificação de violências interpessoais e autoprovocadas", publicado pelo Ministério da Saúde em 2017, assinale qual das seguintes afirmativas é verdadeira sobre a importância da notificação de violências.

- a) **A notificação é fundamental para a realização de ações de prevenção e controle, pois permite a identificação de padrões e a mobilização de recursos para o enfrentamento da violência.**
- b) A notificação de violências interpessoais e autoprovocadas é opcional e pode ser ignorada pelos profissionais de saúde conforme sua avaliação.
- c) Apenas as violências autoprovocadas devem ser notificadas, uma vez que as violências interpessoais não apresentam impacto significativo na saúde pública.
- d) A notificação deve ser feita exclusivamente por médicos, não sendo necessária a participação de outros profissionais de saúde.

07. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra busca garantir a equidade no acesso aos serviços de saúde e promover a valorização da cultura negra. Inclui ações de cuidado, atenção, promoção à saúde e prevenção de doenças, bem como de gestão participativa, participação popular e controle social, produção de conhecimento, formação e educação permanente para trabalhadores de saúde, visando à promoção da equidade em saúde da população negra. Pode-se afirmar que melhor representa um dos princípios fundamentais dessa política é a:

- a) Implementação de programas de saúde exclusivos para a população indígena.
- b) Criação de hospitais especializados apenas para a população branca.
- c) **Promoção da saúde e prevenção de doenças com foco na realidade social e histórica da população negra.**
- d) Adoção de práticas de saúde que desconsiderem as especificidades culturais da população negra.

08. A população LGBT sempre esteve à margem dos serviços públicos e nunca foi vista na saúde como um ator social integrante daquele espaço. Essa população como um todo não se via como se tivesse direitos, como se aquele espaço fosse dela. O que a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais traz é a construção de que o espaço público de saúde também é um espaço da população LGBTQAPIN+. Logo, a política preconiza essa abertura, recepção e acolhimento desse público pelos serviços e equipamentos de saúde. Sendo assim, dentre as assertivas abaixo, marque aquela que corretamente afirma algo sobre esta temática.

- a) A Política Nacional de Saúde Integral reconhece a importância do acesso da população LGBT a serviços de saúde de qualidade, considerando suas especificidades e promovendo ações que visem a inclusão e o respeito à diversidade.
- b) O documento estabelece que a saúde da população LGBT deve ser tratada apenas em relação a doenças sexualmente transmissíveis, desconsiderando outras questões de saúde pertinentes a esse grupo.
- c) O documento não menciona a necessidade de formação e capacitação de profissionais de saúde para atender a população LGBT, uma vez que a abordagem deve ser padrão para todos os grupos.
- d) A Política Nacional de Saúde Integral propõe que ações de saúde para a população LGBT sejam realizadas exclusivamente por organizações não governamentais, sem a participação do Sistema Único de Saúde (SUS).

09. O Programa Nacional de Imunização vem contribuindo para a redução da morbimortalidade causada pelas doenças imunopreveníveis, buscando a qualidade e a segurança dos produtos oferecidos para a manutenção e a disponibilidade, em tempo oportuno, dos imunobiológicos preconizados nos calendários e nas campanhas nacionais de vacinação para a população brasileira. Neste sentido, o PNI vem desenvolvendo e aperfeiçoando ferramentas para possibilitar a melhor instrumentalização e qualificação das atividades de vacinação em todo o território nacional. Sendo assim, podemos considerar que: A vacinação em adultos é fundamental para a manutenção da saúde pública (Razão), porque doenças preveníveis por vacinas podem afetar indivíduos em qualquer fase da vida, não sendo restritas à infância (Asserção). Assinale abaixo a assertiva que contém a melhor relação entre asserção e razão sobre a temática:

- a) A asserção e a razão estão corretas, e a razão justifica corretamente a asserção.
- b) A asserção e a razão estão corretas, mas a razão não justifica a asserção.
- c) A asserção está correta, mas a razão está incorreta.
- d) A asserção está incorreta, mas a razão está correta.

10. A compreensão sobre os cuidados paliativos (CP) vem sendo elaborada ao longo de seu processo de definição, atualizado pela Organização Mundial da Saúde em 2018. Ela determina que cuidados paliativos são uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes (adultos e crianças) e famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida, prevenindo e aliviando o sofrimento por meio da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e de outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais. De acordo com este conceito, assinale a assertiva que melhor define o principal objetivo dos cuidados paliativos no tratamento de pacientes com doenças graves e progressivas.

- a) Prolongar a vida do paciente, instrumentalizando sua rede de apoio, utilizando todos os recursos médicos disponíveis.
- b) Melhorar a qualidade de vida do paciente e de sua família, aliviando o sofrimento e controlando os sintomas.
- c) Focar exclusivamente no tratamento curativo do paciente, informando a sua família, independentemente do estágio da doença.
- d) Oferecer apenas suporte psicológico para o paciente e sua família, sem interferir no tratamento médico e dos demais profissionais.

QUESTÕES 11 A 50 – Conteúdo Específico.

11. A literatura científica demonstra que várias doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) estão associadas à saúde bucal deficiente, especialmente a presença de Periodontite. Assim sendo, pode-se afirmar que:

- a) O tabagismo não é doença.
- b) A diabetes mellitus é uma doença exclusivamente hereditária e sua associação com a periodontite é casual.
- c) Não há evidência suficiente para respaldar a associação entre as doenças cardiovasculares e a periodontite.
- d) **Dentre as DCNT, a diabetes mellitus, as doenças cardiovasculares e o tabagismo são as condições mais associadas à piora da periodontite.**

12. Acerca da dentina primária é **CORRETO** afirmar que é:

- a) **Depositada por odontoblastos originais.**
- b) A primeira dentina a ser formada.
- c) Fisiologicamente depositada após a rizogênese.
- d) Formada em resposta a estímulos externos.

13. A Mucosite é uma inflamação da mucosa oral, resultante dos efeitos citotóxicos diretos da radiação ou de determinados agentes antineoplásicos. Acerca deste tema, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Seu surgimento geralmente ocorre ao final de quarta semana nos pacientes submetidos a radioterapia de cabeça e pescoço.
- b) É uma alteração oral exclusiva dos pacientes em radioterapia, não ocorrendo nos pacientes submetidos a quimioterapia.
- c) **Seu surgimento geralmente ocorre ao final da segunda semana nos pacientes submetidos a radioterapia de cabeça e pescoço.**
- d) Pode ocorrer em qualquer fase do tratamento radioterápico, independente do sítio que sofre a radiação.

14. O aumento de câncer oral no Brasil é preocupante, estando entre os dez cânceres mais frequentes na população. As taxas de incidência e de mortalidade ocasionadas por este tipo de patologia encontram-se entre as mais elevadas do mundo. Em relação ao câncer oral, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) **Maior incidência entre os 45 até os 65 anos.**
- b) Tem maior prevalência em mulheres.
- c) No Brasil as neoplasias são mais frequentes nas regiões Sul e Nordeste.
- d) Hábitos de vida e alimentação não são fatores associados ao câncer de cabeça e pescoço.

15. Considerando a influência das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e a Periodontite, já foi demonstrado que o tratamento periodontal mecânico não-cirúrgico para as Periodontites pode resultar em melhora de várias doenças crônicas. Assim sendo, marque a afirmativa **INCORRETA**.

- a) Realizando um tratamento completo com raspagem supra e subgengival e alisamento radicular podemos remover cálculo dental, biofilme e endotoxinas das superfícies radiculares.
- b) As medidas de instrução de higiene oral são fundamentais no tratamento, pois, estão relacionadas à principal causa da Periodontite, porém, são relativamente ineficazes quando usadas isoladamente.
- c) Na raspagem subgengival e alisamento radicular a instrumentação reduz de modo considerável o número de microorganismos subgengivais e em consequência, reduz a inflamação clínica local.
- d) **A raspagem subgengival e alisamento radicular apresentam resultados de maior ganho de inserção e redução de bolsa quando as bolsas iniciais são mais rasas.**

16. Um paciente sofreu um acidente de carro e fraturou o esmalte e dentina do dente 11, com ausência de exposição da polpa. Concomitante a fratura coronária foi verificada sensibilidade à percussão, mobilidade aumentada, porém sem deslocamento dentário. Assim, depreende-se que o paciente sofreu uma fratura coronária:

- a) Não complicada com concussão.
- b) Complicada com subluxação.
- c) Complicada com concussão.
- d) Não complicada, com subluxação.

17. Pacientes submetidos a radioterapia na região de cabeça e pescoço sofrem com alterações orais de impacto direto na qualidade de vida. A redução da saliva nesses pacientes é uma seqüela da radioterapia que dificulta a fala e a deglutição. Sobre o tema assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Glândulas salivares serosas tem sensibilidade maior à radioterapia em comparação com as glândulas salivares mucosas.
- b) Independente da quantidade de radiação as glândulas sofrem danos que são reversíveis ao final do tratamento.
- c) A sensação de boca seca geralmente é reportada ao afinal da ultima semana de tratamento radioterápico devido a hiperplasia compensatória das glândulas não afetadas.
- d) A secura sintomática da boca aparece mais fortemente associada a perda da secreção serosa da glândula parótida.

18. A partir da Convenção-Quadro da OMS para o Controle do Tabaco (tratado internacional para o controle do tabaco, do qual o Brasil é signatário desde 2005), houve uma redução significativa da prevalência de tabagistas no Brasil. Sobre o tabagismo pode-se afirmar que:

- a) O tabagismo não tem associação com a baixa condição socioeconômica referente às formas destrutivas de periodontite nas populações de adolescentes.
- b) Foram identificados fatores de risco para a perda dental incluindo tabagismo, saúde dentária inadequada, pobreza e outros traços sócio-comportamentais, e condição periodontal inadequada.
- c) A relação entre tabagismo e periodontite ainda não está clara, faltando uma plausibilidade biológica para essa suposta associação.
- d) Não existe nenhuma evidência que o tabagismo contribui significativamente para potencializar a disbiose subgingival.

19. O tratamento oncológico com quimioterapia e radioterapia é acompanhado comumente de sintomas e alterações orais. A maioria dos agentes quimioterápicos é tóxico a medula óssea e, de alguma maneira, afeta as células normais no corpo, provocando efeitos colaterais que variam de acordo com as drogas na quimioterapia e as doses de radiação. Assinale a alteração oral mais prevalente indesejada ao paciente.

- a) Periodontite.
- b) Fluxo salivar aumentado.
- c) Xerostomia.
- d) Sangramento.

20. Pode-se afirmar, em relação a terapia periodontal não cirúrgica, que:.

- a) A raspagem subgingival e alisamento radicular resultam em mudanças dimensionais importantes, onde ocorre maior ganho de inserção e redução de bolsa quando as bolsas iniciais são mais profundas.
- b) No caso das periodontites, a raspagem subgingival e alisamento radicular resulta em regeneração completa dos tecidos periodontais de suporte perdidos durante a doença.
- c) No caso das periodontites, as medidas de instrução de higiene oral não são essenciais para o sucesso do tratamento, pois, o paciente tem uma pré-disposição genética.
- d) Após a raspagem subgingival e alisamento radicular não verificamos melhora na mobilidade dentária, pois esta é geralmente causada por trauma oclusal.

21. Acerca dos testes diagnósticos é **CORRETO** afirmar que:
- a) O teste de anestesia seletiva consiste na realização de anestesia do dente suspeito de causar a dor, se a dor cessar após anestesia identifica-se o dente sinálgico.
 - b) Pacientes com necrose pulpar podem acusar desconforto ao teste de calor devido a presença de fibras do tipo C remanescentes.
 - c) Caso seja necessário repetir o teste de sensibilidade a frio, com gás refrigerante, este deve ser realizado imediatamente após o primeiro teste.
 - d) Pacientes com rizogênese incompleta apresentam geralmente uma resposta exacerbada aos testes de sensibilidade, apresentando falso-positivo.
22. O Conhecimento das alterações orais e seus respectivos sítios anatômicos de maior prevalência decorrentes do tratamento antineoplásico são cruciais para um adequado manejo do paciente. É **CORRETO** afirmar que a mucosite oral associada à:
- a) Quimioterapia envolve comumente as superfícies ceratinizadas.
 - b) Radioterapia de cabeça e pescoço é comum, afetando exclusivamente as superfícies não-ceratinizadas.
 - c) Quimioterapia envolve comumente as superfícies não-ceratinizadas.
 - d) Radioterapia de cabeça e pescoço é incomum, afetando exclusivamente as superfícies ceratinizadas.
23. A nova Classificação das doenças periodontais (2018) foi elaborada para suprir deficiências de classificações anteriores. Dentre as modificações incorporadas nessa nova classificação identifique a afirmativa **CORRETA**.
- a) Incorporação do estadiamento e grau de progressão das doenças periodontais no sistema de classificação, considerando o tabagismo e a diabetes mellitus.
 - b) Não considera saúde periodontal no sistema de classificação.
 - c) Não considera fatores de risco para as doenças periodontais.
 - d) Incorporação do nível de escolaridade dos indivíduos como fator primordial para a classificação das doenças periodontais no sistema de classificação.
24. Em relação a anatomia interna do 2º molar inferior é **CORRETO** afirmar que:
- a) Apresenta anatomia semelhante ao 1º molar superior, porém em proporções maiores.
 - b) Há maior tendência a apresentar uma maior divergência das raízes, em comparação com o 1º molar inferior.
 - c) Pode ser encontrado o radix entomolaris, que é uma raiz supranumerária na vestibular dos molares.
 - d) Apresenta alta prevalência de anomalias de desenvolvimento, como canais em C.
25. O tratamento odontológico prévio ao tratamento oncológico, tem o objetivo de eliminar ou estabilizar as condições orais, para minimizar infecção local e sistêmica aumentando a qualidade de vida do paciente. O exame odontológico deve ser realizado minuciosamente e **NÃO** precisa incluir:
- a) Solicitação de radiografia panorâmica.
 - b) Avaliação do perfil facial.
 - c) Adequação do meio bucal.
 - d) Avaliação periodontal.
26. Considerando os aspectos epidemiológicos das doenças periodontais identifique a opção onde a afirmativa está **CORRETA**.
- a) Existe absoluta certeza de que a prevalência mundial de periodontite está caindo.
 - b) A prevalência de periodontite em adultos não ultrapassa 20% no mundo.
 - c) Recentemente, ficou evidente que fatores psicossociais não fazem parte da prevalência das doenças periodontais.
 - d) A prevalência da periodontite é bastante variável considerando essa variabilidade como resultado dos diferentes critérios utilizados em diferentes estudos, fatores de risco associados, e outros aspectos envolvidos na patogênese.

27. Um paciente de 35 anos compareceu ao consultório odontológico relatado dor intensa, espontânea, pulsátil e difusa na arcada inferior do lado esquerdo, sendo diagnosticado que o dente 36 apresentava pulpíte irreversível. Acerca da pulpíte irreversível é **CORRETO** afirmar que:

- a) Em estágios avançados, quando o calor é aplicado pode exacerbar a dor e o frio pode causar alívio da sintomatologia.
- b) Para o diagnóstico de pulpíte irreversível é imprescindível que o paciente apresente dor espontânea.
- c) No geral a polpa responde a baixas correntes no teste elétrico.
- d) O póliplo pulpar é um tipo de pulpíte irreversível, resultante de uma agudização da inflamação pulpar.

28. A osteorradiocrecrose é uma das complicações mais graves da radioterapia em região de cabeça e pescoço. Embora a prevenção seja enfatizada rotineiramente, alguns casos ocorrem, necessitando de um conhecimento profundo do profissional. A respeito do tema assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A maioria dos casos ocorre de maneira espontânea.
- b) A maxila é predominantemente o sítio preferencial de ocorrência.
- c) Não apresenta alterações radiográficas.
- d) A dose da radiação é o principal fator associado à necrose óssea.

29. A Medicina Periodontal (MP) é uma área da Periodontia que abrange o conhecimento das associações entre doenças periodontais e sua influência em outras partes do corpo e vice-versa. Considerando a MP podemos afirmar que:

- I. Evidências adicionais da ligação entre as infecções periodontais e a doença vascular aterosclerótica são procedentes de vários estudos que confirmaram a presença de bactérias bucais nos ateromas.
- II. Não existem evidências convincentes de que a disfunção endotelial é mais acentuada nos pacientes com periodontite do que nos controles saudáveis.
- III. A doença periodontal é uma inflamação crônica e compartilha vias de mecanismos comuns com outras doenças inflamatórias sistêmicas. Existem associações comórbidas entre a periodontite, o diabetes e as doenças cardiovasculares.

A respeito dessas afirmativas acima, assinale a opção **CORRETA**.

- a) I e II são proposições verdadeiras.
- b) II e III são proposições verdadeiras.
- c) I e III são proposições verdadeiras.
- d) Nenhuma afirmativa é verdadeira.

30. Marque a alternativa **CORRETA** sobre as propriedades das soluções irrigadoras utilizadas em endodontia:

- a) O hipoclorito de sódio tem sua ação antimicrobiana inativada em meio ácido.
- b) A atividade antimicrobiana da clorexidina é excelente na faixa de pH entre 4 e 5,5.
- c) A clorexidina é bactericida, independente da concentração utilizada.
- d) A temperatura e concentração das soluções de hipoclorito de sódio interferem na eficácia da ação solvente e antimicrobiana do hipoclorito de sódio.

31. Em relação as doenças orais, o câncer é tratado por cirurgia, radiação e/ou quimioterapia, muitas vezes a combinação dessas terapias é utilizada. Os agentes quimioterápicos são drogas potentes que destroem ou desativam as células cancerígenas. Os efeitos colaterais significativos dessas drogas frequentemente envolve os tecidos bucais. Em relação aos efeitos colaterais, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Mucosite é uma mudança inflamatória na mucosa oral e causa dor.
- b) Xerostomia é o aumento fluxo salivar.
- c) A sensibilidade dentinária não ocorre durante o tratamento.
- d) A osteorradiocrecrose não é uma condição que preocupa no atendimento desses pacientes.

32. Na Medicina Periodontal (MP), existem evidências que sustentam a relação da periodontite com algumas condições sistêmicas. Considerando a MP podemos afirmar que:

- I. A Periodontite é conhecida por induzir uma inflamação sistêmica crônica de baixo grau, que pode ser relevante para o surgimento ou a progressão de numerosas doenças não transmissíveis.
- II. Uma recente metanálise de estudos observacionais que relatou os níveis de proteína C reativa confirmou que os pacientes que sofriam de periodontite não tinham níveis consistentemente mais altos de proteína C reativa quando comparados com os controles sem periodontite.
- III. O comprometimento da função renal pode estar associado à inflamação sistêmica decorrente da Periodontite.

A respeito dessas afirmativas acima, assinale a opção **CORRETA**:

- a) I e II são proposições verdadeiras.
- b) I e III são proposições verdadeiras.
- c) II e III são proposições verdadeiras.
- d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

33. Uma paciente de 29 anos compareceu ao consultório odontológico com aumento de volume do lado direito da face, próximo a região dos pré-molares, relatando dor intensa. Na anamnese a paciente relatou estar com 8 semanas de gestação. Sabendo-se que a paciente apresenta abscesso agudo do dente 34, o protocolo de atendimento **CORRETO** para esta paciente é o seguinte:

- a) A paciente encontra-se no trimestre considerado mais crítico para gestante, sendo o segundo trimestre a melhor época para atendimento.
- b) Apesar da septicemia não ser teratogênica, em caráter de urgência, o tratamento é voltado para o controle da dor e remoção de focos de infecção.
- c) Apesar de todos os anestésicos atravessarem a placenta, é recomendado o uso de anestésico com vasoconstritor, porém sendo contraindicado o uso de fenilefrina.
- d) Os localizadores apicais, utilizados para fazer odontometria, não devem ser utilizados em gestantes e pacientes com marcapasso.

34. Nos pacientes em tratamento antineoplásico é frequente o surgimento de toxicidades com manifestações orais. Entre algumas das principais alterações observadas, destaca-se a:

- a) Disgeusia, definida como alteração do olfato.
- b) Disgeusia, definida como alteração do paladar.
- c) Disfagia, definida como uma dificuldade de fonação.
- d) Disfagia, definida como uma dificuldade de abertura bucal.

35. Com relação ao Hidróxido de cálcio utilizado na endodontia, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) O íon de hidroxila oriundo da dissociação do hidróxido de cálcio tem importante ação antimicrobiana e sua associação com soro fisiológico permite sua dissociação rápida.
- b) Os efeitos antimicrobianos do hidróxido de cálcio estão relacionados ao seu pH ligeiramente ácido.
- c) O hidróxido de cálcio é um pó branco altamente miscível em água em qualquer proporção.
- d) A associação do hidróxido de cálcio com o paramonoclorfenol, um veículo aquoso, aumenta as chances de dor pós-operatória.

36. A neoplasia maligna associada à síndrome da imunodeficiência adquirida, caracterizada por lesões com coloração azul-roxeada, localizadas preferencialmente em: gengiva, língua e palato duro, é denominada de:

- a) Condrossarcoma.
- b) Sarcoma de Kaposi.
- c) Carcinoma epidermóide.
- d) Carcinoma espinocelular.

37. Diabetes mellitus têm sido apontada como uma condição endócrina que, eventualmente, pode contribuir para a síndrome metabólica em conjunto com a obesidade. Em relação à Periodontite pode-se afirmar que:

I. No nível vascular, o acúmulo de produtos finais da glicação avançada (AGEs, do inglês *advanced glycation end products*) altera a função de vários componentes da matriz intercelular, incluindo o colágeno das paredes vasculares, resultando em espessamento da membrana basal capilar e de perda da elasticidade vascular.

II. A hiperglicemia crônica leva ao acúmulo de AGEs, que se ligam aos macrófagos e aos monócitos, resultando em um aumento nos níveis de liberação de mediadores pró-inflamatórios e em uma inflamação gengival mais grave, com níveis mais altos de IL-1 β e metaloproteinase da matriz-8.

III. A hiperglicemia também promove estresse oxidativo diretamente, e tanto a inflamação quanto o estresse oxidativo podem contribuir para formação adicional de AGE. Esses mecanismos, juntamente com o impacto dos patógenos periodontais, perpetuam esse ciclo vicioso de estresse inflamatório e comprometimento do reparo do periodonto do paciente diabético.

A respeito dessas afirmativas acima, assinale a opção **CORRETA**:

- a) I e II são proposições verdadeiras.
- b) I, II e III são verdadeiras.
- c) II e III são proposições verdadeiras.
- d) I e III são proposições verdadeiras.

38. Com relação às doenças crônicas não transmissíveis o tratamento periodontal não cirúrgico é capaz de:

- a) Reduzir a formação de colágeno.
- b) Aumentar a reabsorção óssea.
- c) Impactar na creatinina.
- d) Reduzir a proteína C reativa.

39. Com relação a microbiota associada a infecções endodônticas, marque a alternativa **CORRETA**:

- a) A microbiota é constituída primariamente por cocos, bacilos e espirilos, numa infecção mista com predomínio de anaeróbios estrictos.
- b) As espécies microbianas podem variar de indivíduo para indivíduo em um mesmo tipo de infecção e ainda de acordo com a localização geográfica.
- c) Em casos de fracasso do tratamento primário, devido a um tratamento inadequado prévio, são encontradas até 5 espécies, diferindo dos casos de infecção primária.
- d) Algumas lesões assintomáticas podem se tornar sintomáticas espontaneamente, e são denominadas de *flare-up*, tendo os casos sintomáticos comunidades bacterianas diferentes das assintomáticas.

40. Um adequado exame clínico possibilita avaliar as características estruturais e funcionais das regiões examinadas. A disseminação de processos patológicos infecciosos e malignos pode ocorrer por via linfática, sendo de extrema importância o conhecimento acerca do tema. É **CORRETO** afirmar que linfonodos:

- a) Não reativos tendem a ter superfície irregular com aspecto endurecido.
- b) Reativos apresentam sempre aspecto amolecido e redução do tamanho.
- c) Não reativos a superfície geralmente é irregular e de aspecto flutuante.
- d) Não reativos tendem a ser móveis, indolores e podem ser difíceis de serem palpados.

41. Uma criança de 9 anos caiu da própria altura e os responsáveis a levaram imediatamente para o consultório odontológico. O dentista observou a intrusão dos incisivos centrais superiores. No exame radiográfico não foi verificada fratura dentária, mas os dentes estão em processo de rizogênese. A conduta mais adequada para esta criança é:

- a) Extração dentária.
- b) Extrusão e contenção dos dentes.
- c) Extrusão cirúrgica.
- d) Ré-erupção espontânea.

42. Em relação à associação entre parto prematuro ou de bebê de baixo peso e a periodontite, podemos afirmar que:

- I. A Periodontite pode desencadear uma resposta imunoinflamatória e/ou a supressão dos fatores de crescimento locais na unidade feto-placentária.
- II. A Periodontite pode contribuir para uma bactéria transitória via hematogênica atingindo a unidade feto-placentária.
- III. Os mediadores locais oriundos da Periodontite, como por exemplo, as prostaglandinas E-2 podem através da circulação atingirem a unidade feto-placentária, aumentando a produção de citocinas pró-inflamatórias.

a) I, II e III são verdadeiras.

b) I e II são proposições verdadeiras.

c) II e III são proposições verdadeiras.

d) I e III são proposições verdadeiras.

10

43. O câncer oral é um tumor maligno que afeta os lábios e as estruturas orais, como gengivas, bochechas, palato, língua e a região de assoalho da boca. É o quinto tumor mais frequente em homens no Brasil. A maioria dos casos é diagnosticada em estágios avançados. É fator de risco para o câncer bucal:

a) Tabagismo.

b) Hipertensão arterial.

c) Obesidade.

d) Diabetes.

44. Evidências de estudos de intervenção indicam que o tratamento periodontal não cirúrgico pode:

a) Reduzir a proteína C reativa em 70%.

b) Reduzir o colesterol (LDL) interferindo na aterogênese.

c) Reduzir a pressão arterial sistêmica em até 70%.

d) Não é capaz de reduzir aterogênese.

45. Sobre abscesso perirradicular agudo é **CORRETA** a assertiva:

a) Normalmente os testes frio e de cavidade apresentam resposta positiva.

b) O canal deve ser instrumentado e obturado em sessão única.

c) Ocorre quando a resposta inflamatória não consegue eliminar o agente agressor ou reduzir a intensidade da injúria, resultando na exacerbação caracterizada por uma inflamação purulenta.

d) Quando se desenvolve pela agudização de um granuloma, é verificado um espessamento do ligamento periodontal através da radiografia.

46. Acerca da doença endodôntica-periodontal verdadeira é **CORRETA** a alternativa:

a) Apresenta lesão periapical com extensão lateral coalescendo com a bolsa periodontal, estando a polpa necrosada.

b) Em caso de fístula, é contraindicado realizar retalho cirúrgico para não ter mais perda óssea.

c) Apresentam polpa viva e pequena lesão periapical.

d) O prognóstico depende basicamente da eficácia do tratamento endodôntico.

47. A candidíase é uma infecção fúngica causada por *Candida albicans*, é de longe a infecção fúngica oral mais comum nos humanos e pode se apresentar de formas diversas. A respeito da patologia acima descrita, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) O subtipo de candidíase eritematosa é mais comum que a pseudomembranosa, embora muitas vezes seja negligenciada clinicamente.
- b) Também conhecida como sapinho, a candidíase crônica hiperplásica é caracterizada pela presença de placas brancas removíveis a raspagem.
- c) A candidíase do tipo eritematosa é o tipo mais raro, sendo mais comum na região anterior da mucosa jugal.
- d) A candidíase mucocutânea é uma forma mais branda da doença, frequente em pacientes hígidos.

48. Sobre a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV-1), pode-se afirmar que:

- a) Pacientes infectados pelo HIV-1 e portadores de periodontite parecem ter maior risco de agravamento da periodontite.
- b) Mulheres infectadas pelo HIV-1 parecem ter maior risco de desenvolverem periodontite avançada do que os homens.
- c) Não há sugestão de associação entre a infecção pelo HIV-1 e alterações não microbioma intestinal.
- d) Alguns trabalhos de revisão sistemática sugerem que implantes dentários não devem ser colocados em pacientes infectados pelo HIV-1, mesmo quando em controle da doença.

49. Os cistos e tumores odontogênicos constituem um aspecto importante na patologia oral e maxilofacial. Os cistos odontogênicos são comumente encontrados na prática odontológica. Em contraste, os tumores odontogênicos são lesões incomuns. Mesmo em um laboratório especializado em patologia oral e maxilofacial, menos de 1% de todos os espécimens recebidos são tumores odontogênicos. Dentre os tumores odontogênicos, o mais comum na cavidade oral é:

- a) Fibroma.
- b) Cementoma.
- c) Odontoma.
- d) Ameloblastoma.

50. Os cistos odontogênicos são classificados de acordo com a sua origem como de desenvolvimento ou inflamatório. Assinale a alternativa que apresenta somente cistos e tumores de origem odontogênico.

- a) Cisto dermóide e cementoblastoma.
- b) Cisto dentífero e cisto do arco branquial.
- c) Cisto nasolabial e fibroma ameloblástico.
- d) Cisto periodontal lateral e ameloblastoma.